

RECOMANACIONS GENERALS PEL CONTROL DE DIABÈTICS

1. Abans de cada administració d'INSULINA, cal assegurar-se que l'animal té gana, i que, per tant, després de punxar menjarà.
En cas que no volgués menjar, no administrarem insulina o, en tot cas, la meitat de la dosi d'insulina que li toqui a aquella hora, i al cap de 45-60 minuts li tornarem a oferir menjar. Si tot i així, seguís sense voler menjar, esperarem al "següent torn".
2. Per preparar la INSULINA:
 - a. Cal treure-la de la nevera uns dos minuts abans de fer-la servir
 - b. S'ha d'homogenitzar el líquid molt suaument. És important no sacsejar fort el vial. L'agafarem amb dos dits i el tombarem deu o dotze vegades
 - c. Desinfectar la gometa del vial amb alcohol. Quan es manipuli la xeringa, no tocar l'agulla amb els dits
 - d. Asegurar-se que no hi ha bombolles d'aire dins la xeringa
3. És importantíssim que la dieta sigui l'adequada (la millor opció són les dietes comercials per a diabètics), però encara ho és més que les quantitats siguin constants, s'administrin a les mateixes hores.
4. Cal controlar diàriament la glucosa en orina, mitjançant les tires reactives GLUKETUR de Roche (n'hi ha de més econòmiques, però poc fiables). És aconsellable anotar-ne els resultats, sobretot durant la primera fase del procés.
5. Tenir molt en compte que és més perillosa la HIPOGLUCÈMIA -nivells baixos de glucosa en sang- que no pas una glucosa alta. Per tant hem d'estar atents a quins són els símptomes típics de la HIPOGLUCÈMIA:
 - a. Intranquil·litat, inquietut
 - b. L'animal busca activament el propietari, li crida l'atenció
 - c. Tremolors
 - d. Convulsions

En cas que observessiu algun d'aquests símptomes, hem de fer dues coses:

- Donar una petita quantitat de **sucre** a l'animal: preneu com a mesura una culleradeta de café. Un cop li heu donat el sucre, espereu 1 o 2 minuts per veure l'evolució.
- Avisar el Veterinari de seguida